

## Výskyt hraboše polního v lednu 2025

12. 02. 2025

10. 2. 2025 - Výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily stagnaci populací hraboše polního v zimním období. Z celorepublikového průměru 297 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v listopadu 2024 hodnoty v lednu 2025 mírně vzrostly na 321 AVN/ha, což odpovídá 0,8násobku prahu škodlivosti dle jeho přepočtu napříč sledovanými plodinami. Přestože stav hraboše polního stagnuje, je nutné bedlivě sledovat vývoj populací v časném předjaří z důvodu podchycení případné gradace v době, kdy je možné proti škodícím jedincům ještě zasáhnout. Zvýšená četnost aktivních východů z nor byla zjištěna v kraji Olomouckém, Středočeském a Ústeckém kraji.

Inspektoři ÚKZÚZ monitorovali v lednu 2025 výskyt hraboše polního v jednoletých i víceletých plodinách. Zhruba polovina pozorování byla provedena na trvalých travních porostech, v sadech a v krmných plodinách. Průměrné hodnoty se zde pohybovaly na úrovni 626 AVN/ha (tj. 1,5násobku aktuálního prahu škodlivosti, jenž představuje do konce února 400 AVN/ha pro plodiny starší jednoho roku). Průměrný počet AVN/ha v ozimých plodinách činil 88 AVN/ha, což odpovídá hodnotě 0,4násobku aktuálního prahu škodlivosti (ten odpovídá hodnotě 200 AVN/ha).

I když riziko ohrožení porostů hrabošem polním nepředstavuje na počátku roku kalamitní ohrožení, přesto se objevují místa, kde se stav populací může výrazně odlišovat od průměrné situace v ČR. Extrémní výskyty, přesahující 6 000 AVN/ha (tj. 15násobek prahu škodlivosti), byly zjištěny kupříkladu v porostech vojtěšek na Berounsku. Místa se také mohou objevovat škody v krmných plodinách pěstovaných na Mělnicku, Teplicku, Šumperku nebo Nymbursku. Vysoké hodnoty nad 1 000 AVN/ha byly zjištěny také v porostech řepky a pšenice Středočeského a Ústeckého kraje.

Lokálně zvýšené hodnoty populací v tomto období nejsou neobvyklé. Při trvajících problémech s hraboši je možné využít aplikace rodenticidů do nor v základní dávce 2 kg/ha. Aplikovat lze v místech, kde to umožní půdní a meteorologické podmínky.

Připomínáme, že aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením.

Aktuální vývoj populací hraboše polního můžete nepřetržitě sledovat na [Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ](#).

Přílohy:

Grafy výskytu hraboše polního - leden 2025 - [stáhnout \(pdf, 692 kB\)](#)