

Výskyt hraboše polního v únoru 2025

11. 03. 2025

10. 3. 2025 - Výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily mírný nárůst populací hraboše polního v časně jarním období. Z celorepublikového průměru 321 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v lednu hodnoty v únoru mírně vzrostly na 351 AVN/ha, což odpovídá 0,9násobku prahu škodlivosti dle jeho přepočtu napříč sledovanými plodinami. V současné době je patrný nárůst populací na plochách s meziplošinami a krmnými plodinami. Zde je nutné vývoj populací bedlivě sledovat a případnou gradaci podchytit ještě před tím, než se jedinci z časně jarních vrhů stačí rozšířit na přilehlá pole s ozimými plodinami, kde mohou způsobit hospodářsky významné škody. Zvýšená četnost aktivních východů z nor byla zjištěna v Královéhradeckém, Olomouckém, Pardubickém, Středočeském a Ústeckém kraji.

Inspektoři ÚKZÚZ monitorovali v únoru výskyt hraboše polního v jednoletých i víceletých plodinách. Zhruba 40 % pozorování byla provedena na trvalých travních porostech, v sadech a v krmných plodinách. Průměrné hodnoty se zde pohybovaly na úrovni 666 AVN/ha (tj. 1,7násobku aktuálního prahu škodlivosti, jenž představoval do konce února pro plodiny starší jednoho roku 400 AVN/ha). Průměrný počet AVN/ha v ozimých plodinách činil 138 AVN/ha, což představovalo 0,7násobek aktuálního prahu škodlivosti (ten odpovídal hodnotě 200 AVN/ha).

Od 1. března se mění práh škodlivosti z 200/400 AVN/ha na 50 AVN/ha ve všech plodinách, což posune škodlivost na čtyř- až osmi- násobek současně dosahovaných hodnot. Na některých lokalitách tak může dojít k rychlému nárůstu škod. Extrémní výskyty, přesahující 4 000 AVN/ha (tj. 10násobek prahu škodlivosti), byly zjištěny kupříkladu v porostech vojtěšek na Olomoucku, Teplicku a Trutnovsku. Škody se také mohou místy objevovat v krmných plodinách pěstovaných na Mělnicku, Nymbursku, Prostějovsku, nebo Rakovnicku, kde byly potvrzeny hodnoty nad 1 000 AVN/ha.

Lokálně zvýšené hodnoty populací v tomto období nejsou neobvyklé, přesto se doporučuje při prvním možném termínu využít aplikace rodenticidů do nor v základní dávce 2 kg/ha. Od počátku roku 2025 byly nahlášeny aplikace na cca 4 100 hektarech orné půdy. Nejvíce hlášení přichází z krajů s pravidelnými výskyty škod, tj. z kraje Jihomoravského, Olomouckého, Středočeského a Ústeckého.

Připomínáme, že aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením.

Aktuální vývoj populací hraboše polního můžete nepřetržitě sledovat na [Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ](#).

Mgr. Petra Hrabčáková, Ph.D., tisková mluvčí

Grafy výskytu hraboše polního - únor 2025 ([pdf, 709 kB](#))